



# Staphylosal®

## Gebrauchsinformation

**Pharmazeutischer Unternehmer**  
Dr. Assmann Veterinärspécialitäten GmbH  
Kehler Str. 7 · 76437 Rastatt

**Mitvertreiber und Hersteller**  
Biokanol Pharma GmbH  
Kehler Str. 7 · 76437 Rastatt

## WERAVET 10 Staphylosal

### Mischung zum Eingeben

für Pferde, Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen, Hunde, Katzen

Hepar sulfuris C 30

Homöopathisches Arzneimittel für Tiere

### Zusammensetzung

1 ml (981,89 mg) Mischung enthält:

Wirkstoff:

Hepar sulfuris Dil. C 30 99,55 mg

Sonstige Bestandteile:

Ethanol 43% (m/m), Gereinigtes Wasser

Das Arzneimittel enthält 18% (V/V) Alkohol.

### Anwendungsgebiete

Die Anwendungsgebiete entsprechen dem veterinär-homöopathischen Arzneimittelbild, dazu gehören:

- Eiterungen aller Art
- Nabelinfektionen
- Abszessbildung
- Verschleppte Bronchitiden bei Großtieren
- Otitis externa des Hundes

**Gegenanzeigen** Keine bekannt

**Nebenwirkungen** Keine bekannt

Hinweis:

Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Tierarzt befragen.

Falls Sie eine Nebenwirkung bei Ihrem Tier feststellen, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt ist, teilen Sie diese Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit.

**Zieltierarten** Pferd, Rind, Schwein, Schaf, Ziege, Hund, Katze

### Dosierungsanleitung

Pferde 20 Tropfen

Rinder 20 Tropfen

Schweine 15 Tropfen

Schafe 15 Tropfen

Ziegen 15 Tropfen

Hunde 10 Tropfen

Katzen 10 Tropfen

### Art der Anwendung

Zum Eingeben mit dem Futter oder über das Trinkwasser

Am besten ins Trinkwasser gelöst oder auf Brot, bzw. in 10 ml Wasser gelöst über das Futter geben.

### Dauer der Anwendung

2 mal täglich bis zum Eintritt der Heilung.

Die Verabreichung des Medikamentes sollte nicht länger erfolgen als bis zur vollständigen Heilung des Tieres: Ein homöopathisches Arzneimittel ist bei gesunden Tieren dazu geeignet, ein dem homöopathischen Arzneimittelbild entsprechendes Krankheitsbild (Symptomatik) auszulösen.

### Wartezeit

Pferde, Rinder, Schafe, Ziegen, Schweine

essbare Gewebe: 0 Tage

Pferde, Rinder, Schafe, Ziegen

Milch 0 Tage

### Besondere Lagerungshinweise

Nicht über 25°C lagern.

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren!

Das Arzneimittel nach Ablauf des auf Behältnis und äußerer Umhüllung angegebenen Verfalldatums nicht mehr anwenden.

Die Dauer der Haltbarkeit nach Anbruch beträgt 6 Monate

Nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums nach Anbruch sind im Behältnis verbleibende Reste des Arzneimittels zu verwerfen.

### Besondere Warnhinweise

#### Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung

Die Anwendung des Arzneimittels sollte nicht ohne tierärztlichen Rat erfolgen und ersetzt nicht andere vom Tierarzt diesbezüglich verordnete Arzneimittel.

Bei folgenden Anzeichen sollten Sie den Tierarzt aufsuchen, da es sich um eine Erkrankung handeln kann, die einer ärztlichen Diagnose bedarf:

- Fieber
- Akute und starke Entzündungszeichen wie Röte, Hitze, Schwellung, Schmerz und Funktionsstörung
- Schwere Beeinträchtigung des Allgemeinbefindens
- Unruhezustände
- Blutungen
- Eitriger oder blutiger Auswurf bei Bronchitiden
- Länger andauernde Hautveränderungen, Verfärbungen der umgebenden Haut und starke Rötung von Wundrändern
- Anhaltende, unklare, periodisch oder neu auftretende Beschwerden.

Bei den Krankheitsbildern „Abszessbildung“, „verschleppte Bronchitiden bei Großtieren“ und bei den Krankheitsbildern, die mit einer Verletzung oder starken Veränderung der Hautoberfläche einhergehen, ist vom Tierarzt über die Notwendigkeit einer antibiotischen Behandlung zu entscheiden.

Die Anwendung von WERAVET 10 Staphylosal sollte unter Berücksichtigung des homöopathischen „Simile-Prinzips“ erfolgen. Dazu ist die Konsultation eines Tierarztes zur Ermittlung des Krankheitsbildes (homöopathische Anamnese) anzuraten.

Bei folgenden Erkrankungen darf WERAVET 10 Staphylosal nur zur unterstützenden Behandlung angewendet werden:

- Mangelzustände infolge verminderter Aufnahme lebensnotwendiger Nährstoffe.
- Erkrankungen, die einer chirurgischen Behandlung bedürfen wie z.B. großflächige Verletzungen, innere Blutungen, diffuse Phlegmonen, Fremdkörperabszesse und Abszesse, die in Körperhöhlen fisteln.

Vor Behandlungsbeginn sollten die Ursachen der Beschwerden daher möglichst weitgehend abgeklärt sein.

### Anwendung während der Trächtigkeit und Laktation

Zur Anwendungssicherheit von WERAVET 10 Staphylosal während der Trächtigkeit und der Laktation liegen keine Untersuchungsergebnisse vor.

Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Trächtigkeit und Laktation nur nach Rücksprache mit dem Tierarzt angewendet werden.

### Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln oder Mitteln, soweit sie die Wirkung des Arzneimittels beeinflussen können

Die gleichzeitige Gabe eines unverträglichen Arzneimittels, welches die Wirkung von WERAVET 10 Staphylosal aufheben könnte, ist zu vermeiden. Fragen Sie dazu Ihren Tierarzt.

**Stand der Information** September 2008

### Weitere Angaben

Originalpackung mit 20 ml und 50 ml

### Apothekenpflichtig

**Zulassungsnummer: 6157977.00.00**



**Biokanol Pharma GmbH**

Kehler Straße 7 · 76437 Rastatt

Tel.: 07222-78679-0 · Fax: 07222-78679-9

www.biokanol.de · info@biokanol.de